

日本薬局方  
複方ヨード・グリセリン  
Compound Iodine Glycerin

本剤の使用前にこの説明事項を必ずお読みください。  
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 1) 医師の治療を受けている人
  - 2) 本またはヨウ素に対し過敏症の既往歴のある人
  - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 4) 甲状腺の疾患のある人
  - 5) 口内のひどいだれがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診断を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん発疹等があらわれる。

- 2) 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合

成分・分量

本品 1000 mL 中	
日局 ヨウ素	12 g
日局 ヨウ化カリウム	24 g
日局 グリセリン	900 mL
日局 ハッカ水	45 mL
日局 液状フェノール	5 mL
日局 精製水	適量

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 5) 使用中に薬液がこぼれ衣服等が着色したら、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)の液で洗うこと

効能・効果

のどの殺菌・消毒

用法・用量

適宜、適量を患部に塗布する

(用法・用量に関する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 塗布用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) のどに塗るととき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること
- 4) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること
- 5) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤って飲み込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること
- 6) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること

【包装】 50 mL



外箱



キャップ: PP  
中栓: PE



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷 3-14-16

C06-TS

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)