

第3類医薬品

食塩喪失時の補給に

食塩錠

「タイヨ」 Sodium Chloride Tablets

60錠

効能・効果

食塩喪失時の補給

用法・用量

成人(15歳以上)1回4錠、1日10回を限度とし、服用する
(用法・用量に関連する注意)
定められた用法・用量を厳守すること

60錠

食塩錠

「タイヨ」 Sodium Chloride Tablets

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明事項を必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 血圧の高い人又は高齢者
 - 3) 心臓又は腎臓に障害のある人
 - 4) むくみのある人
 - 5) 妊婦又は妊婦していると思われる人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気、嘔吐
精神神経系	頭痛
循環器	血圧上昇
泌尿器	尿量減少(顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる)
その他	顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる

3. 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合はこの製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

開け口

成分・分量

40錠中、塩化ナトリウム(食塩) 20g

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 2) 小児の手の届かない所に保管すること
- 3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと


上手な飲み方

- 本剤1～2錠につき250～500mL/回の水を摂取してください。
- 高温多湿な場所での運動や労働で汗を多くかく方は、発汗量に合わせて本剤の服用量を調節してください。

食塩喪失時の補給に

第3類医薬品

1錠中
塩化ナトリウム
0.5g含有



大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝日は除く)



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



外箱



キャップ
ボトル
緩衝材



D14-TS

函留当座

台異景補