

日本薬局方
加香ヒマシ油
Aromatic Castor Oil
瀉下剤
(下剤)

この説明事項は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

- 次の人は服用しないこと。
 - はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - 3歳未満の乳幼児。
 - 防虫剤（ナフタリン等）、殺そ剤（猫イラズ等）等の薬剤を誤って服用した人。（このような場合は、直ちに医師の治療を受けること。）
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
駆虫薬、他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
- 連用しないこと。

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
下痢

効能・効果

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

用法・用量

大人（15歳以上） 1回 20 mL
11歳以上～15歳未満 1回 13 mL
7歳以上～11歳未満 1回 10 mL
3歳以上～7歳未満 1回 6 mL
いずれも1日1回を限度としてそのまま又は水、牛乳などに浮かべて必要時服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 本剤は定められた用法、用量を守ること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 就寝前の服用を避けること。

成分及び分量

本品20 mL中にヒマシ油19.8 mL、ハッカ油0.1 mL、オレンジ油0.1 mLを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

【包装】 20 mL



外箱



キャップ：PP

ガラス：瓶

D06-TS



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-34-5

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)