

使用に際して、この説明書を必ず読んでください。

販売名：イージーガーグルS

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の症状のある人。口内のひどいだれ(4)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいする。

のどの殺菌
消毒・口臭除去に

イージー
ガーグル
S

470mL

う
が
い

薬

第3類医薬品

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、うがい液をはき出せない年齢の小児には使用させないでください。(3)本剤はうがい用のみ使用してください。(4)本剤は必ずうすめて使用してください。また、うすめた液はすぐに使用してください。

成分・分量

本品100mL中、ポリドンヨード(有効ヨウ素として0.7g)……………7.0g

添加物：エタノール、l-メントール、サッカリンナトリウム水和物、ヨウ化カリウム、香料

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。(5)衣類等に付着すると着色しますのでご注意ください。付着した場合はすぐに水でよく洗い流してください。(6)プラスチック類、塗装面に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。

◆ 容器の使い方 ◆

ポンプのストッパー(青色)を手前に引いて取りはずすとポンプが使用可能の状態になります。数回空押しをしてポンプ内に液がたまると、1回に1mL薬液がでるようになります。一度はずしたストッパーは再使用しないでください。

◆ 使いやすいポンプ式 ◆

1押し1mL 一般に使われているコップ(180mL)に薬剤を2～4mL(2～4回押し)入れて、水(60mL:約1/3)でうすめます。その液でうがいをしてください。

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142 ㊞



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)



ポンプ
ボトル
外装フィルム



紙ラベル

MADE IN JAPAN

使用期限



製造番号

J24-FL



一般に使われているコップ
(180mL)に2～4回押しします。



水(60mL:1/3)でうすめます。
その液でうがいをしてください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

飲まないこと