

グリセリンカリ液「TGK」

医薬部外品

本剤の使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管して下さい。



使用上の注意

1. 次の人は使用しないこと
湿潤やただれのひどい人
2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
3. 用法・用量に関する注意
 - 1) 定められた用法・用量を厳守すること
 - 2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもと使用させること
 - 3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと
 - 4) 外用のみに使用し、内服しないこと
 - 5) 長期連用しないこと
4. 使用中又は使用後の注意
 - 1) 本剤の使用により、刺激感、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
 - 2) 本剤を使用しても症状の改善が見られない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
5. 保管及び取り扱い上の注意
 - 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
 - 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
 - 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
 - 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

効能・効果

ひび、あかぎれ

用法・用量

そのまま適量を患部に塗布する

成分・分量

本品 100 mL 中

日局 水酸化カリウム ······ 0.3 g

日局 グリセリン ······ 20 mL

日局 エタノール ······ 25 mL

添加物として、香料を含有する。

【包装】 100 mL



外箱



キャップ : PP

中栓 : PE

ボトル : PE

L05-TS



製造販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)