

日本薬局方
炭酸水素ナトリウム
(重曹)
Sodium Bicarbonate

本剤の服用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 腎臓に障害のある人
 - 2) 医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 2週間位服用しても症状の改善がみられない場合

〈用法・用量に関する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとで服用させること

成分・分量

本品 1 g 中に、日局 炭酸水素ナトリウム 1 g を含有する

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管すること
- 5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲み過ぎ

用法・用量

食前または食間に服用する
スプーンすり切り一杯は約 1.5 g

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15才以上)	1.5 g	3回
8才以上 15才未満	成人量の 1/2	3回
3才以上 8才未満	成人量の 1/4	3回
3才未満の 乳幼児	服用しないこと	

【包装】 500 g



外箱



内袋：PE
スプーン：PA

E05-TS



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）