

アクリノール液大洋

医薬品

Acrinol Solution

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えは発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - 2)患部が広範囲の人
 - 3)深い傷やひどいやけどの人
 - 4)医師の治療を受けている人
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

切傷、擦過傷、化膿性創傷、火傷等の殺菌・消毒

用法・用量

創面に適量を塗布するか、本液を浸したガーゼを当てて包帯又は紺創膏にて被う
(用法・用量に関する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること
- 4) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること

成分・分量

本品は日局 アクリノール0.2%を含む

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいで注意すること
- 4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

【包装】 30mL



外箱



キャップ：PP
中栓：PE
ボトル：PE

100mL



外箱
キャップ：PP
中栓：PE
ボトル：PE

30mL J05-TS
100mL E05-TS



製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)