

アクリノールガーゼ大洋

医薬品

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - 2) 患部が広範囲の人
 - 3) 深い傷やひどいやけどの人
 - 4) 医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ等
 - 2) 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

切傷、創傷、化膿傷

用法・用量

添付のピンセットで適量を患部に当て、
その上に油紙を当て包帯する
(用法・用量に関連する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用のみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること
- 4) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること

成分・分量

本品1000 g 中		
日局 アクリノール	1.84g	
日局 グリセリン	20.00g	
医療 ガーゼ	80.00g	


保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので注意すること
- 4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

【包装】 5 cm × 5 cm 8枚重ね 8枚



外箱



キャップ：PP
ボトル：PE

ピンセットでガーゼを取り出してください。

8枚重ねガーゼが一回使用分で、取り出しやすく、8回分使用できます。

〔内 容 量〕

アクリノール0.2%溶液60mLをガーゼ5cm×5cm・8枚重ね-8枚にしみこませたもの
ピンセット1本、油紙13.5cm×19.5cm1枚
(適當な大きさに切って使用してください。)

F05-TS



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

