

日本薬局方 アンモニア水

Ammonia Water

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕

- 次の部位には使用しないこと
 - 口唇等の粘膜の部分、目や目のまわり
 - 傷のある所（虫さされによる刺傷は除く）
 - ただれたり、かぶれている所
- 局所刺激作用があるので、用法・用量にしたがって患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

- 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発赤、はれ、灼熱感等

- 2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

虫さされ

用法・用量

5～10倍に希釈して患部に軽く塗る
（用法・用量に関連する注意）

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科専門医の診療を受けること
- 外用にのみ使用し、内服しないこと

成分・分量

本品はアンモニア9.5～10.5w/v%を含む

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 直射日光をさけ、高温の場所には保管しないこと
- 揮発性であるので、使用後は密栓すること
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

【包装】 100mL



外箱



キャップ：PP

中栓：PE

ボトル：PE

L05-TS



製造販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）