

第3類医薬品

殺菌消毒剤

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

本剤のご使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

成分

本品1mL中、日局 無水エタノール1mLを含有します。(15℃でエタノール(C_2H_6O :46.07) 99.5vol%以上を含まれます。)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光及び火気を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)本液はニス溶于するので、ニスの塗ってある建具や家具等には本液が付着しないように注意してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

日本薬局方

無水エタノール

(無水アルコール)

Anhydrous Ethanol

無水エタノール「コザカイ・P」

500mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-36-9

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる】

1. 軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
2. 次の部位には使用しないでください。
目の周り、口唇等の粘膜の部分(局所刺激作用があるため。)



☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

本品を精製水でうすめて、エタノールとして76.9～81.4vol%とし、これを脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗布する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 定められた用法を厳守してください。
- (5) 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂綿による皮膚荒れを起こすことがありますので注意してください。
- (6) 長期間または広範囲に使用する場合、蒸気の吸入に注意してください。

火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



C12-FL ガラス:瓶

使用期限:

製造番号:

