

日本薬局方
塩化ベンザルコニウム
Benzalkonium Chloride Solution

この説明事項は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 原液のまま使用しないこと。
2. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状、
(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等) を起こしたことがある人。
(2) 患部が広範囲の人。
(3) 深い傷やひどいやけどの人。
(4) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

- 手指の殺菌・消毒
- 創傷面の殺菌・消毒
- 口腔内の殺菌・消毒

用法・用量

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

- 手指の殺菌・消毒の場合：塩化ベンザルコニウムとして 0.05～0.1% (本剤の 100～200 倍液)
- 創傷面の殺菌・消毒の場合：塩化ベンザルコニウムとして 0.01～0.025% (本剤の 400～1,000 倍液)
- 含嗽の場合：塩化ベンザルコニウムとして 0.005～0.01% (本剤の 1,000～2,000 倍液)

(希釈方法) 本剤のキャップは 1 杯は約 5 mL です。

- 100 倍液・・・本剤キャップ 2 杯を水 1 L に溶かす。
- 200 倍液・・・本剤キャップ 1 杯を水 1 L に溶かす。

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を守ること。
2. 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。
3. 原液又は濃厚液が目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
5. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
6. 外用にのみ使用し、内服しないこと。

成 分

塩化ベンザルコニウム 10W/V% 水溶液。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

その他

1. 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。
2. 染色した布地は退色することがあるので注意すること。

その他の使用方法

◇理容所、美容所での消毒

バリカン、櫛、ブラシ、鋏等は、石ケンで洗い十分に油分を除き、石ケン分が残らないように水洗した後、塩化ベンザルコニウム 0.1% (本剤の 100 倍) 溶液に 10 分以上浸す。金属器具の消毒保存には、0.5～1% の濃度となるように亜硝酸ナトリウムを加えるとさびを防ぐことができる。

その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法

1. 食器・器具類の消毒
茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本剤の 200～500 倍液に 5 分以上浸した後水洗いする。
2. 家屋、乗物等の消毒
床、畳、家具、調度品、手洗い場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本剤の 200～500 倍液で清拭するか又は噴霧する。
3. 塵芥箱、冷蔵庫の消毒
本剤の 100～200 倍液を噴霧する。
4. その他
食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の 200～500 倍液を用いる。

【包装】 100 mL



外箱



キャップ：PP
容器：PE

500 mL



キャップ：PP
容器：PE
外装フィルム：PE



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-34-5

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

100 mL A06-TS