

日本薬局方 クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution

殺菌消毒剤

この説明事項は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕

- 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
- 次の部位には使用しないこと。
 - 目、目のまわり、口唇等には使用しないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

- 手指の消毒の場合：1～2%（本剤の50～100倍）
創傷面の消毒の場合：1～2%（本剤の50～100倍）
便所等の消毒の場合：3%（本剤の33倍）

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- 本品は使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所には十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。
- 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には、上澄み液を使用すること。

組 成

本品はクレゾール42～52vol%を含む。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 直射日光をさけ、密栓して保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状（炎症）が起きた場合は医師の診療を受けること。（原液を取り扱う場合は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用すること。）

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒
便所、便器、ごみ箱、たんつぼ、浄化槽等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

〈希釈方法〉

	100mL キャップ1杯 約5mL	500mL キャップ1杯 約7.5mL
50 倍 液	キャップ4杯を 水1Lに溶かす	キャップ4杯を 水1.5Lに溶かす
100 倍 液	キャップ2杯を 水1Lに溶かす	キャップ2杯を 水1.5Lに溶かす

【包装】 100mL



外箱



キャップ：PP
容器：PP

500mL



キャップ：PP
容器：PP
外装フィルム：PE



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-34-5

100mL K06-TS
500mL L06-FL

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）