

第2類医薬品

日本薬局方

クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution

殺菌消毒剤

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

- 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
- 次の部位には使用しないこと。
 - 目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗し、直ちに眼科医の診療を受けること。
 - 広い範囲の皮膚または深い傷に使用しないこと。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
 - 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒

便所、便器、ごみ箱、たんぽば、浄化そう等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

- 手指の消毒の場合 : 2% (本剤の50倍液)
- 創傷面の殺菌の場合 : 1% (本剤の100倍液)
- 便所等の消毒の場合 : 3% (本剤の33倍液)

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- 本品は使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所に十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。
- 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

(希釈方法)

- 33倍液 : 本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。
50倍液 : 本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。
100倍液 : 本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

成分・分量

本品は、クレゾール42~52vol%を含む。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- 小児の手が届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。
(原液を取扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。)

【包装】 100mL、500mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷 998-1

100mL C09-MS
500mL C09-MS

大洋製薬お客様相談窓口
0120-184328
受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝日除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931