

日本薬局方 希ヨードチンキ Dillute Iodine Tincture

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。
また、必要とき読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる】

1. 次の部位には使用しないこと
口唇等の粘膜の部分、口の中、目や目のまわり
2. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと
3. 皮膚炎を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - 3) 本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある人
 - 4) 患部が広範囲の人
 - 5) 深い傷やひどいやけどの人
 - 6) 化膿した部位に使用したい人（症状を悪化させるおそれがある）
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その時は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
アナフィラキシー 様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、 発疹等があらわれる

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

適量を1日数回患部に塗布する

（用法・用量に関連する注意）

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること
- 4) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 5) 本製品をお使いになるときは、脱脂綿・綿棒等を使用し、患部に軽く塗布すること
- 6) マーキュロクロム液を同じ患部に使用しないこと

成分・分量

本品100mL中

日局	ヨウ素	3 g
日局	ヨウ化カリウム	2 g
日局	エタノール	73.4 mL
日局	精製水	適量

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光及び火気をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 5) 開栓注意：容器のフタを開けると、液がこぼれることがあるので、注意すること
- 6) 使用中に薬液がこぼれ衣服等が着色したら、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）の液で洗うこと。液がこぼれて服などに着くと落ちにくくなるので、フタを開けるときは注意すること

【包装】 50 mL



外箱



キャップ：PP

ガラス：瓶

J05-TS



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）