

# イージーガーグル

医薬品

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

**使用上の注意**

**してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人は使用しないこと  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人  
**相談すること**  
1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること  
1) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
3) 次の症状のある人  
　口内のひどいだれ  
4) 甲状腺の疾患のある人  
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること  
1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる

2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 用法・用量

1回、本剤2~4mLを水約60mLに薄めて1日数回うがいする。

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を守ること
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 本剤はうがいのみに使用し、内服用としては使用しないこと
- 本剤は使用するときのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用すること
- 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがある

## 成分・分量

本品100mL中

ポビドンヨード 7g (有効ヨウ素 0.7g)

添加物：ヨウ化K、l-メントール、ユーカリ油、エタノール、プロピレンジコール、グリセリン

## 保管及び取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所にてて保管すること
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 使用中に薬液がこぼれ衣服等が着色したら、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）の液で洗うこと

## 効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【包装】 500mL



ポンプ : PP  
ボトル : PE  
外装フィルム : PE

K06-FL



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)