

第3類医薬品

殺菌消毒剤

飲用不可

消毒用エタノール IK

Ethanol for Disinfection IK

火気厳禁 アルコール類
危険等級Ⅱ 水溶性

500mL

スプレー式

手指・皮膚の
殺菌・消毒に

2013年9月作成

本剤のご使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 局所刺激作用があるため、塗擦又は清拭するだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付けしないでください。
- 次の部位には使用しないでください。
(1)損傷のある皮膚
(2)目の周囲、粘膜等

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果 手指・皮膚の殺菌・消毒

用法・用量 塗擦またはガーゼ、脱脂綿等に
浸して清拭する。

〈用法・用量に関する注意〉


- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 定められた用法を厳守してください。
- 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがありますので注意してください。
- 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

成 分

本品100mL中、日本薬局方 エタノール83mLを含有します。添加物としてイソブロパノールを含有します。[エタノール(C_2H_6O : 46.07) 76.9~81.4vol%を含有します。]

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光及び火気を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- 使用時は特に火気に注意し、ストーブ、コンロ等、火気の近くで使用しないで下さい。
- 変質、変色を起こすおそれがあるので、適用箇所以外に本液が付着しないよう注意してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



青いストッパーを下に引き抜くご使用いただけます。

使用後は、誤って噴出しないよう、ストッパーをして保管して下さい。

※最初にお使いになると、液が出るまで数回空押しをして下さい。



4

発売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

製造販売元

小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土曜日、祝日は除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



スプレー
ボトル
外装フィルム
使用期限:
製造番号: