

日本薬局方
オキシドール
Oxydol

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

1. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ

- 2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

成分・分量

本品は過酸化水素 2.5～3.5 w/v % を含む。
添加物：フェナセチン、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、30℃以下の所に密栓して保管すること
- 3) 使用後は密栓すること
- 4) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけること
- 5) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 6) 使用期限を過ぎたものは使用しないこと

効能・効果

傷の消毒、洗浄

用法・用量

そのままの液または2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う

(用法・用量に関連する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること
- 4) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること
- 5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

【包装】 100 mL



キャップ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PE

500 mL



キャップ：PE
ボトル：PE
外装フィルム：PP



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

100 mL D05-FL

500 mL D05-FL