

外皮消毒剤 スキニーエイド80

医薬部外品

チャイルドロックで安全！簡単スプレー式！ 外用専用/80mL

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- 1) 患部が広範囲の人
- 2) 深い傷やひどいやけどの人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

成分・分量

本品100mL中

ベンザルコニウム塩化物 50mg

添加物：リン酸二水素 Na、リン酸水素 Na 水和物、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限(底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

【包装】80mL

効能・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の洗浄・消毒



キャップ：PE, PP
ボトル：PE
外装フィルム：PE

用法・用量

1日数回、適量を患部に直接噴霧または脱脂綿、ガーゼ等に噴霧して塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 4) 外用にのみ使用し、内服しないこと

H07-TS



製造販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)