

花粉、ハウスダスト等による鼻のアレルギー症状の緩和に

第2類医薬品

**タイヨー鼻炎スプレーAG**



クロモグリク酸ナトリウム配合点鼻薬

**特 徴**

※抗アレルギー剤のクロモグリク酸ナトリウム、抗ヒスタミン剤・クロルフェニラミンマレイン酸塩、血管収縮剤・ナファザリン塩酸塩を含むアレルギー専用点鼻薬です。

※花粉・ハウスダスト等による鼻のアレルギー症状を緩和します。

※鼻アレルギー症状による鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重などの症状に効果を発揮します。

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>クロモグリク酸ナトリウム<br/>(抗アレルギー剤)</p>  <p>肥満細胞の膜を安定化し、ヒスタミン等のアレルギー症状の原因となる物質の放出を抑えます。</p> | <p>クロルフェニラミンマレイン酸塩<br/>(抗ヒスタミン剤)</p>  <p>ヒスタミン受容体を遮断し、くしゃみ、鼻みず等の症状を緩和します。</p> | <p>ナファザリン塩酸塩<br/>(血管収縮剤)</p> <p>鼻粘膜の腫れや充血を抑え、鼻づまりの症状を改善します。</p> |
|---|--|---|

**使用上の注意****してはいけないこと**

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります）
2. 長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 1) 医師の治療を受けている人
  - 2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
  - 3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 5) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
  - 6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 鼻     | 刺激感、鼻出血、はれ   |
| 精神神経系 | 頭痛           |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

| 症状の名称       | 症 状  |
|-------------|--|
| アナフィラキシー様症状 | 使用後すぐに息苦しさ、浮腫（咽喉、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。 |

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 症状の改善がみられても2週間を越えて使用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵) などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：  
鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

## 用法・用量

次の量を、両鼻腔内に噴霧してください

| 年齢        | 1回使用量 | 1日使用回数           |
|-----------|-------|------------------|
| 成人(15歳以上) | 1噴霧ずつ | 3～5回             |
| 7歳～15歳未満  |       | (3時間以上の間隔をあけること) |
| 7歳未満      |       | 使用しないこと          |

3日間位使用しても症状の改善が見られない場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

1. 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがありますので用法・用量を厳守してください
2. 7歳以上の小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
3. 本剤は点鼻用のみ使用し、目や耳に使用しないでください
4. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状がひどい場合には眼科専門医の診療を受けてください

### ■使い方

1. 本剤のご使用前にはよく鼻をかむか、鼻を洗浄してください
2. 薬液が十分に鼻の奥まで到達するように、噴霧後は頭を後ろに傾けてゆっくりと鼻から息をすいこんでください

1. 図のように容器を持ってください。  
最初にご使用になる時に液が出るまで数回空押しを行ってください。  
この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし、液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。



2. ノズルを軽く鼻腔内に入れ、フックを下げてください。スプレー時は、容器をかたむけずお使いください。



3. 使用後は、ノズルを清潔なティッシュペーパー等できれいにふいてください。

※ノズルの先端を針等でつつくのは大変危険ですのでおやめください。

## 成分・分量

本品100mL中

|                 |         |
|-----------------|---------|
| クロモグリク酸ナトリウム    | 1,000mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 250mg   |
| ナファゾリン塩酸塩       | 25mg    |

添加物：ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください
2. 小児の手の届かないところに保管してください
3. 誤用をさけるため、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください
4. 汚染をさけるため、他の人と共用しないでください
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください
6. 使用後はノズル付近を清潔なティッシュペーパー等で拭き、キャップをして保管してください

製造販売元  
**大洋** 大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931