

開封口

TaiyosHIP  
support your well being

TaiyosHIP

support your well being

TaiyosHIP

TaiyosHIP

support your well being

ご使用に際して、この箱の説明文をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、開封後は期限内であっても品質保持の点からなるべく早く使用してください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

成分・分量 本品 100mL中

ナファゾリン塩酸塩…………… 50mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩… 500mg  
リドカイン…………… 300mg  
ベンゼトニウム塩化物…………… 20mg  
添加物：グリセリン、エタノール、カルメロースナトリウム、ポリソルベート80、pH調節剤、香料

用法・用量

成人(15歳以上)及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

用法・用量に関連する注意

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
4. 点鼻用にのみ使用し、内服/目や耳に使用しないでください。

使い方

1. 図のように容器を持ってください。最初にご使用になる時は液が出るまで数回空押しを行ってください。この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし、液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。

2. 静かに息を吸い込みながらノズルを軽く鼻腔内に入れ、はね部を下げてください。スプレー時は、容器をかたむけずにお使いください。

(液が残っている音はするが出ない時) 液を吸い上げるチューブは図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていますので容器をかたむけずにお使いいただくと、むだなくお使いいただけます。

※汚染の原因等になりますので、使用後は、ノズルを清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。※ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのをおやめください。※容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。※容器をかたむけずお使いいただいても、ごくわずかに液が残る場合があります。液が少量になれば、チューブ先端が液に浸るようにすると、最後まで使用できます。

トリナート  
点鼻薬  
鼻水  
鼻づまり  
くしゃみ、頭重

すばやく効いて  
スツキリ!

花粉 ハウスダスト ダニ

30mL

セルフメディケーション

税 控除 対象

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎  
又は副鼻腔炎による諸症状の緩和

第2類医薬品

Indications:

Relief of the following symptoms due to acute rhinitis, allergic rhinitis or sinusitis: stuffy nose, runny nose (excessive nasal secretion), sneezing, dull headache (heaviness in the head).

Dosage and administration:

For adults (15 years or over) and children aged 7 years or over, spray once to twice per dose into the nasal cavity, once to fifth a day. Keep interval of more than 3 hours. Under 7 years: Do not use

Ingredient and amount:

In 100 ml  
Naphazoline Hydrochloride 50mg  
Chlorpheniramine Maleate 500mg  
Lidocaine 300mg  
Benzethonium Chloride 20mg  
Excipients: Glycerin, Ethanol, Carmellose Sodium, Polysorbate 80, pH adjuster, flavor

Taiyo Pharmaceutical Co., Ltd.  
MADE IN JAPAN

発売元

大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

製造販売元

株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

