

ポビドンヨード の消毒液

ポビエイド
Povi Aid
50mL

指定医薬部外品

傷の洗浄・消毒に ポビドンヨード の消毒液

ポビエイド
Povi Aid

50mL

ポビエイドの有効成分「ポビドンヨード」は、各種の細菌、真菌、ウイルスに対して幅広く、優れた殺菌・消毒効果を発揮します。本品はエタノールを含有していないため、しみにくい製剤となっております。

用法・用量

1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないこと
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 3) 石けんなどの併用は本剤の洗浄・消毒作用を弱める事があるので、石けん分を洗い落とししてから使用すること
- 4) 定められた用法・用量を厳守すること
- 5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

成分・分量

本品100mL中 ポビドンヨード 10g
(有効ヨウ素 1.0g)

添加物:グリセリン、クエン酸水和物、リン酸水素Na水和物、クエン酸Na水和物

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 2) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 薬液が衣服等に着色し水で落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)の液を用いて洗うこと。ただし、ハイポの液は稀に色落ちの原因になる事もあるので、必ず目立たない部分でお試しいただき使用すること
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16



御園街第

台豊薬舖

本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

× [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- 1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2) 患部が広範囲の人
- 3) 深い傷やひどいやけどの人

※ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
シラック (アブラカシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦し等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、尿量しき等があらわれる

- 2) 5~6日間使用しても症状がよくなりません


効果・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

販売名:ポビエイド
消毒液 外用専用 50mL 指定医薬部外品

上手な使い方

液がこぼれても、大丈夫なところで消毒しましょう!
消毒前によく手を洗いましゅう。



● 傷を水道水などで洗浄し砂や異物を取り除いた後、傷に薬液をつけます。



- 薬液を清潔な綿棒や綿球などで、傷と傷の周りを十分に囲う程度に(1cm以上を目安に)伸ばします。
- 約30秒後に患部を水道水で軽く洗い流してから清潔なガーゼ等で水分を拭き取り、ばんそうこうや傷保護剤で被ってください。

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)



4 975175 020404

A15-TS